



## Anlæg af OnFarm Forsøg

Hold forsøget så simpelt som muligt, afprøv kun få behandlinger. Det kan f.eks. være to forskellige doseringer af et planteværnsmiddel eller ensartet eller gradueret gødskning.

Jo flere gange du gentager dine behandlinger i marken des bedre, vi anbefaler 4 gentagelser pr. mark.

Der bør høstes mindst 500 m<sup>2</sup> og gerne 1.000 m<sup>2</sup> pr. parcel. Det er afgørende, at du kan høste med fuldt skår, derfor skal den enkelte parcel som minimum være 1-2 m bredere end mejetærskeren, så plejespor samt steder med risiko for overlap med sprøjte ikke indgår i det skår du høster til dit forsøg.


Forsøget bør markeres tydeligt i hvert hjørne, så det nemt kan ses, og du undgår at køre unødigt i forsøget.

Vurder ud fra marken, hvordan forsøget placeres bedst.

Eksempler på anlæg, hvor der afprøves to forskellige mængder af f.eks. gødning, der udbringes med en marksprøjte, er vist nedenfor.

### Anlæg med 4 gentagelser, hvis marken er bred

Kan du høste 1 skår med din mejetærsker mellem plejesporerne, behandler du ved kun at sprøjte med den ene halvdel af sprøjtebommen, så samme behandling er udført mellem 2 plejespor som vist nedenfor.




Kan du høste 2 fulde skår med din mejetærsker mellem plejesporerne, kan du spare plads, og have 2 forskellige behandlinger mellem 2 plejespor. Behandlingen udføres med den ene halvdel af sprøjten.



### Hvis marken er mere kvadratisk

I en mere kvadratisk mark kan forsøget anlægges på denne måde.



*Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med SEGES.*